

## Dezynfekcja skóry

# ASEPTODERM® CHG

## Alkoholowy środek do dezynfekcji skóry, z 2% chlorheksydyną

- Gotowy do użycia bezbarwny preparat do dezynfekcji skóry
- Oparty na 70 % alkoholu i 2 % chlorheksydynie
- Bez dodatku perfum



### Opis produktu

Gotowy do użycia alkoholowy środek do dezynfekcji skóry. **ASEPTODERM CHG** może być stosowany do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, nacięciami, nakłuciami, pobraniem krwi, wprowadzeniem cewnika i zabiegami chirurgicznymi. **ASEPTODERM CHG** jest delikatny dla skóry. Nie zawiera aldehydów, fenoli i QAC.

### Zakres stosowania

Do dezynfekcji skóry.

### Stosowanie

Nałożyć odpowiednią ilość **ASEPTODERM CHG** na skórę i utrzymywać wilgotność przez cały czas kontaktu.

### Skład

100 g roztworu zawiera:

63,1 g 2-Propanol (70% Izopropanol v/v),  
2,26 g Chlorhexidine Digluconate (CHG).

### Opinie ekspertów

Nasze produkty zostały poddane badaniom ekspertów. Na życzenie możemy je udostępnić.

### Środki ostrożności i stwierdzenia dotyczące zagrożeń

Wysoko łatwopalna ciecz i opary. Powoduje poważne podrażnienia oczu. Może powodować senność lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Trzymać z dala od ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Spektrum działania i czas kontaktu			15 s	30 s	1 min	3 min
Antyseptyka skóry / chirurgiczna dezynfekcja rąk z 3-godzinnyim przedłużonym efektem	EN 12791					•
Bakterie i drożdże						
Działanie bakteriobójcze	EN 13727	warunki czyste			•	
	EN 1276	warunki czyste	•			
Działanie drożdżakobójcze (Candida albicans)	EN 13624	warunki czyste			•	
	EN 1650	warunki czyste	•			
Działanie wobec Tbc (M. terrae)	EN 14348	warunki czyste		•		
Działanie wobec mykobakterii (M. avium and M. terrae)	EN 14348	warunki czyste			•	
Wirusy						
Działanie wobec wirusów otoczkowych	EN 14476	włącz. HBV, HIV, HCV	•			

Zakaz palenia w pobliżu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zdejmij soczewki kontaktowe, jeśli są i łatwo to zrobić. Kontynuuj płukanie. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: zasięgnąć porady lekarza.

Zawartość/pojemnik usuwać do przedsiębiorstwa utylizacji odpadów zgodnie z przepisami miejscowymi / narodowymi.

Wyłącznie do profesjonalnego zastosowania.

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Produkt	Poj.opak.	Zawartość	Opak. zb.	REF
ASEPTODERM CHG	butelka ze sprysk.	100 ml	30	00-520-001EXP
	butelka ze sprysk.	250 ml	20	00-520-002EXP
	butelka	1 L	12	00-520-010EXP

Bezpiecznie używaj środków dezynfekujących. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informacje o produkcie.



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3 · 34323 Malsfeld · Germany · T +49 5664 9496-0 · info@schumacher-online.com

Dr. Schumacher Sp. z o.o.

ul. Jeleniogórska 12 · 59-800 Lubań · Polska · P +48 734 183 876 · www.schumacher-online.com

