

## CHEMISEPT HF

Bezbarwny roztwór dezynfekcyjny na bazie 70% etanolu i 2% chlorheksydyny do przedoperacyjnej antyseptyki skóry i dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

### WŁAŚCIWOŚCI/ZALETY PREPARATU:

- o preparat przeznaczony do ogólnej antyseptyki skóry
- o zawartość chlorheksydyny gwarantuje przedłużone działanie preparatu
- o zgodność z zaleceniami CDC w zakresie dezynfekcji elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych
- o bezbarwny skład pozwala użyć preparatu również do zabiegów kosmetycznych
- o preparat posiada dualną rejestrację

### WŁAŚCIWOŚCI/ZALETY PREPARATU:

Chemisept HF stosowany jest głównie w szpitalach i innych placówkach medycznych. Nadaje się również do stosowania w gabinetach kosmetycznych i salonach kosmetycznych:

- o antyseptyka skóry przed zabiegami chirurgicznymi, wstrzyknięciami i punkcjami
- o przedoperacyjna antyseptyka skóry
- o pobieranie próbek krwi
- o kaniulacja i cewnikowanie
- o dezynfekcja nieinwazyjnych wyrobów medycznych
- o antyseptyka skóry przed zabiegiem kosmetycznym

### WŁAŚCIWOŚCI BIOBÓJCZE:

Spektrum	Czas działania
Antyseptyka przed wstrzyknięciami i pobraniem krwi	30 sekund
Antyseptyka przed kaniulacją, punkcjami stawów i zabiegami chirurgicznymi	60 sekund
Przed przedoperacyjną antyseptyką skóry	90 sekund
Higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500)	30 sekund
Chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791)	90 sekund
Bakterie (EN137272), Grzyby (EN13624), Prątki (EN14348), Wirusy: BVDV, HIV, HBV, HCV, Vaccinia (EN 14476)	30 sekund
Rota, (EN 14476)	60 sekund

### SPOSÓB UŻYCIA:

Chemisept HF jest gotowy do użycia i można go nakładać na skórę przez spryskiwanie lub wcieranie.

**Antyseptyka skóry przed wstrzyknięciami i pobraniem krwi:** Nanieść wystarczającą ilość preparatu na dezynfekowany obszar skóry przez spryskanie lub przetarcie nasączonym wacikiem. Po spryskaniu przetrzeć wacikiem. Zapewnij dokładne zwilżenie i pozostawić roztwór do wyschnięcia. Czas kontaktu 30 sekund.

**Antyseptyka skóry przed operacją:** Nanieść odpowiednią ilość preparatu na obszar operacyjny za pomocą pęsety i nasączonego wacika. Zapewnij dokładne zwilżenie i pozostaw roztwór do wyschnięcia. Dezynfekcja jest wykonywana dwukrotnie (za każdym razem po 45 sekund). Całkowity czas kontaktu wynosi 90 sekund. Folię operacyjną można nakładać tylko na suchą skórę.

**Antyseptyka skóry przed kaniulacją, wstrzyknięciem dostawowym, nakłuciami i artroskopią:** Nanieść odpowiednią ilość preparatu na obszar zabiegowy poprzez spryskanie lub przetarcie nasączonym wacikiem. Zapewnij dokładne zwilżenie przez 30 sekund, a następnie pozostaw do całkowitego wyschnięcia na 30 sekund.

**Dezynfekcja powierzchni wyrobów medycznych:**

Spryskać nasadką kaniuli lub innego wyrobu medycznego i rozprowadzić jednorazową ściereczką lub wacikiem. Czas kontaktu to 30 sekund.

**Biachem Sp. z o.o.**

ul. Alejkowa 21/B9  
15-528 Sowłany  
Tel/Fax: 085 661 21 21

**Chemi-Pharm AS**

Tanassilma tee 11,  
Tanassilma kula, Saku vald,  
Harju maakond 76406  
ESTONIA

## CHEMISEPT HF

**KOMPATYBILNOŚĆ PRODUKTU:**

Chlorheksydyna – 2g, Etanol – 70g

**PRODUKT ZAWIERA SUBSTANCJE CZYNNE:**

Chemisept HF jest preparatem na bazie etanolu i może być używany do wszystkich powierzchni odpornych na działanie alkoholi. Należy zachować szczególną ostrożność przy zastosowaniu środka do powierzchni z niektórych tworzyw sztucznych, powłok z farb i lakierów. Na wypadek niepewności co do odporności danej powierzchni zaleca się indywidualną ocenę materiału przed użyciem preparatu, poprzez wykonanie miejscowej próby.

**CERTYFIKATY I TESTY:**

Pozwolenie nr 7386/18 na obrót produktem biobójczym  
Wyrób medyczny kl. IIa,  
znak CE 0537

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

**KONFEKJONOWANIE:**

Opakowanie	Pojemność	Karton
Butelka	0,1L atomizer	12x0,1L
Butelka	0,25L atomizer	12x0,25L
Butelka	0,5L (eurodyspenser)	12x0,5L
Butelka	1L	12x1L
Kanister	5L	3x5L

**Biachem Sp. z o.o.**

ul. Alejkowa 21/B9  
15-528 Sowlany  
Tel/Fax: 085 661 21 21

**Chemi-Pharm AS**

Tanassilma tee 11,  
Tanassilma kula, Saku vald,  
Harju maakond 76406  
ESTONIA