

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY  
(OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rekombinowana szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, zawierająca jałową zawiesinę oczyszczonego głównego antygeny powierzchniowego wirusa HBV (HbsAg) adsorbowanego na wodorotlenku glinu. Zawiesina do wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych zawierająca 20 µg oczyszczonego białkowego antygeny Hbs , przeznaczona dla osób powyżej 15 roku życia, stosowana wg schematu szczepień: 0,1,6 miesięcy i 0, 7, 21 dni, 12 miesięcy - schemat szybkiego uodpornienia (fiolki – 1 ml.)	szt.	<b>270</b>				
2.	Rekombinowana szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, zawierająca jałową zawiesinę oczyszczonego głównego antygeny powierzchniowego wirusa HBV (HbsAg) adsorbowanego na wodorotlenku glinu. Zawiesina do wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych zawierająca 20 µg oczyszczonego białkowego antygeny Hbs , przeznaczona dla osób powyżej 15 roku życia, stosowana wg schematu szczepień: 0 ,1, 6 miesięcy i 0, 7, 21 dni, 12 miesięcy - schemat szybkiego uodpornienia (ampułkostrzykawki – 1 ml.)	szt	<b>30</b>				
3.	Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio i haemophilus influenzae typ B zawierająca : toksoid błonicy, toksoid tężcowy , toksoid krztuścowy (PT) hemaglutyninę włókienną (FHA), pertaktynę (69 kDa-OMP), wirus polio typ 1, inaktywowany wirus polio typ 2, inaktywowany wirus polio typ 3, oczyszczony polisacharyd otoczkowy Hib. Przeznaczona dla dzieci od 2 miesiąca życia w schemacie szczepienia pierwotnego – 3 dawki i dawka uzupełniająca w drugim roku życia ( ampułko-strzykawki po 0,5 ml z zawiesiną DTPa –IPV + fiołka z liofilizatem Hib+ 2 igły)	szt.	<b>150</b>				
4.	Szczepionka skojarzona zawierająca toksoid błonicy, toksoid tężcowy, trzy oczyszczone antygeny krztuśca [toksoid krztuścowy (PT), hemaglutynina włókienna (FHA) i pertaktyna] adsorbowane na wodorotlenku glinu, trzy typy inaktywowanego wirusa polio (typ 1, 2, 3) oraz oczyszczony polisacharyd otoczkowy haemophilus influenzae typu B (Hib), związany kowalencyjnie z toksoidem tężcowym, antygen powierzchniowy hepatitis B (ilości 10 mikrogramów). Szczepionka zawierająca: 1 ampułkostrzykawkę bez igły po 0,5 ml z zawiesiną (DTPa-IPV-HBV) + 1 fiołka z proszkiem (Hib) + 2 igły.	szt.	<b>500</b>				

5.	Adsorbowana szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, polio i haemophilus influenzae typu B zawierająca toksoid błonicy, toksoid tężcowy, toksoid krztuścowy (hemaglutynina włókienkowa) inaktywowane wirusy polio typ 1, 2 i 3 oraz oczyszczony polisacharyd otoczkowy haemophilus influenzae typu B w postaci ampułkostrzykawki z igłą (zawiesina DTPa -IPV + fiolka z liofilizatem HIB)  <b>Sz.PENTAXIM 1fiol.+0,5ml a-strz+2igł</b>	szt.	<b>200</b>	119,44	23 888,00	8%	25 799,04
6.	Szczepionka przeciw ospie wietrznej do stosowania od 9 miesiąca życia u dzieci i dorosłych, w schemacie dwudawkowym	szt.	<b>170</b>				
7.	Szczepionka przeciw zakażeniom pneumokokowym, skoniugowana, 13-walentna; zawiera sacharydy pneumokokowe; serotyp 6B skoniugowany białkiem nośnikiem ORM i adsorbowany na fosforanie glinu. Dawka 0,5 ml	szt.	<b>360</b>				
8.	Szczepionka przeciw zakażeniom pneumokokowym, skoniugowana, 13-walentna; zawiera sacharydy pneumokokowe; serotyp 6B skoniugowany białkiem nośnikiem ORM i adsorbowany na fosforanie glinu. Dawka 0,5 ml - <b>PROGRAM</b>	szt.	<b>400</b>				
9.	Szczepionka skoniugowana, czterowalentna, przeciwko meningokokom grup A,C,W 135 i Y, do stosowania powyżej 1 roku życia - ampułkostrzykawka 0,5 ml.	szt.	<b>140</b>				
10.	Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu, inaktywowana dla dzieci, w dawce 0,25 ml – zawiesina do wstrzyknięć w ampułkostrzykawce.	szt.	<b>160</b>				
11.	Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla młodzieży i osób dorosłych, w dawce 0,5 ml – zawiesina do wstrzyknięć domięśniowych w ampułkostrzykawce	szt.	<b>30</b>				
12.	Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca dwa antygeny krztuśca – toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana. Ampułko-strzykawka po 0,5 ml z zawiesiną, z 2 osobnymi igłami-pudełko po 1 szt.	szt.	<b>380</b>				
13.	Szczepionka do czynnego uodpornienia dzieci od 2 miesiąca życia, młodzieży i dorosłych przeciw inwazyjnej chorobie meningokokowej wywołanej przez Neisseria meningitidis grupy B. 1 ampułkostrzykawka 0,5 ml z igłą	szt.	<b>270</b>				
14.	Szczepionka do czynnego uodpornienia dzieci od 2 miesiąca życia, młodzieży i dorosłych przeciw inwazyjnej chorobie meningokokowej wywołanej przez Neisseria meningitidis grupy B. 1 ampułkostrzykawka 0,5 ml z igłą - <b>PROGRAM</b>	szt.	<b>300</b>				
15.	Czterowalentna szczepionka przeciw grypie typu split (rozszczepiony wirion), inaktywowana.	op.	<b>200</b>	39,30	7 860,00	8%	8 488,80

	Wskazana do stosowania u osób od ukończenia 6 miesiąca życia. Opakowanie zbiorcze - 10 ampułko-strzykawk po 0,5 ml z igłą (dwa blistry po 5 ampułko-strzykawk)						
	<b>Sz.Vaxigrip Tetra 0,5ml-1 amp.strz.+igła</b>						
16.	Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV stosowana u mężczyzn i kobiet w celu ochrony przed chorobami spowodowanymi przez dziewięć typów wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58) <b>Sz.Gardasil 9 0,5ml x 1amp-strz.+2igły</b>	szt.	<b>100</b>	379,00	3 790,00	8%	40 932,00
17.	Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV stosowana u mężczyzn i kobiet w celu ochrony przed chorobami spowodowanymi przez dziewięć typów wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58) - <b>PROGRAM</b>	szt.	<b>350</b>	313,00	109 550,00	8%	118 314,00