

/Treść oznakowania opakowania produktu biobójczego/

AHD 1000

Preparat do dezynfekcji rąk.

Etanol, 799 mg/g

ZASTOSOWANIE

Płyn, gotowy do użycia preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz nieuszkodzonej i niezmienionej chorobowo skóry w celu utrzymania higieny, w obszarze medycznym, jak i w sektorze żywnościowym, w warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej.

SKŁAD CHEMICZNY

100 g płynu zawiera:

Substancja czynna: 79,9 g etanol (Nr CAS: 64-17-5);

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

Preparat wykazuje działanie:

bakterio- i grzybobójcze: EN 13727, EN 13624, EN 1500 - 30 sek.; prątkobójcze: EN 14348 - 30 sek.; wirusobójcze wobec: wirusów otoczkowych (w tym HIV/HBV/HCV*, Vaccinia) - 30 sek., oraz wobec wirusów bezotoczkowych wg EN 14476 - 1 min. (w tym Polio - 1 min., Adeno, Rota, Noro - 30 sek.).

*wg wytycznych RKI (Instytut Roberta Kocha).

INSTRUKCJA UŻYCIA

Preparat gotowy do użycia – nie rozcieńczać! Wyłącznie do użytku zewnętrznego!

Higieniczna i chirurgiczna dezynfekcja rąk oraz nieuszkodzonej i niezmienionej chorobowo skóry. Wykazuje działanie biobójcze: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze.

DEZYNFEKCJA RĄK: Przed dezynfekcją należy umyć i dokładnie osuszyć ręce. Podczas całego czasu aplikacji ręce muszą być nawilżone skoncentrowanym preparatem. Wcierać aż do wyschnięcia.

Higieniczna dezynfekcja rąk - zgodnie z techniką normy PN-EN 1500:

3 ml AHD 1000 wcierać w skórę rąk przez 30 sek.

Chirurgiczna dezynfekcja rąk i przedramion zgodnie z techniką normy PN-EN 12791:

5 ml AHD 1000 wcierać w skórę przez co najmniej 1,5 min.

Dezynfekcja nieuszkodzonej i niezmienionej chorobowo skóry :

Nanieść odpowiednią ilość preparatu na powierzchnię dezynfekowanej skóry zapewniając całkowite

jej nawilżenie podczas zalecanego czasu ekspozycji (min. 30 sek.).

Stosowanie u dzieci:

Nie przeprowadzono wystarczających badań co do stosowania preparatu AHD 1000 u dzieci. U niemowląt i małych dzieci stosować wyłącznie pod kontrolą lekarza. Jednakże przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem nie należy spodziewać się żadnych działań ubocznych.

Przeciwwskazania: Nie stosować przy nadwrażliwości na składniki preparatu. Przy odpowiednim stosowaniu można używać AHD 1000 w czasie ciąży i laktacji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Punkt zapłonu wg DIN 51 755: 19°C. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Chronić przed dziećmi. Nie stosować po upływie terminu ważności. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. Przekazać do koncesjonowanej firmy zajmującej się przetwarzaniem odpadów.

PIERWSZA POMOC

- **W kontakcie ze skórą:** narażenie tą drogą nie występuje, produkt jest przeznaczony do dezynfekcji rąk i skóry.
- **W kontakcie z oczami:** chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez 10-15 minut trzymając powieki szeroko otwarte. Unikać silnego strumienia wody – ryzyko uszkodzenia rogówki. Skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
- **W przypadku spożycia:** wypłukać usta dużą ilością wody. Nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, pokazać opakowanie lub etykietę. Natychmiast wezwać lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.
- **Po narażeniu drogą oddechową:** wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem.

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych: w oparciu o odstępnne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Preparat w płynie.

Temperatura przechowywania: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Karta SDS dostępna na www.medilab.pl

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 6987/17 (Kat. I, gr.1).

Produkt biobójczy do dezynfekcji rąk. Preparat do użytku profesjonalnego. Wyprodukowano w Niemczech.

SERIA I TERMIN WAŻNOŚCI:

POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA:

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY I DYSTRYBUTOR W POLSCE:

„MEDILAB” Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.

ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok, Polska

Tel. 085 747 93 00, Fax: 085 747 93 01, www.medilab.pl

WYTWÓRCA: Lysoform Dr.Hans Rosemann GmbH, Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin, Niemcy

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
NIP: 521-32-14-182, REGON:015249601

2023 -11- 03
Z upoważnienia Prezesa
WICEPREZES
ds. Produktów Biobójczych

Aleksandra Wilczyńska

