

MD

Medical Devices
Dispositivo medico
Disposable medical
Medizinische Produkte
Dispositif Médical
Dispositivo medico
Zdravotnický prostředek
Výroba lekárničky
Медицинские изделия
Zdravotnička pomagica
경기 기기
医疗器械
Importovateľné prípravky

CE 0483

0483

SÍMBOLOS USADOS Sobre LAS ETIQUETAS
SYMBOLES UTILISÉS SUR LES ÉTIQUETTES
SYMBOLES UTILISADOS EN LAS ETIQUETAS
AU FOND DES ETIQUETTES VERSENT DE SYMBOLES
SYMBOLOS UTILIZADOS NA ETIQUETA
SYMBOLE SON ER ANWENDET AUF ETIKETTEN
SYMBOLE SON ERANVENDET AUF ETIKETTEN
SHANHENG CUMBOJU HU SHIETKE
ETIKET UZERINDE KULLANILAN SEMBOLER
SYMBOLE SON ERANVENDET AUF ETIKETTEN
YUN YU PHARMACEUTICUM ETTE ETIKETTE
【图】上用到的图标
【图】使用时参考
الرموز المطبوعة على العلبة

CUTANPLAST®**CUTANPLAST®****CUTANPLAST®**

IT

Descripción del producto
Cutanplast® es una esponja de gelatina estéril de origen animal, insoluble en agua, absorbible y fácil de utilizar. Su objetivo es ayudar a detener el sangrado. La esponja es blanquecina y su porosidad es uniforme.

Mecanismo de acción

Al saturarse de sangre, el producto promueve la coagulación y actúa como coadyuvante para controlar la hemorragia local. Cuando se emplea correctamente, y en las cantidades adecuadas, Cutanplast® se reabsorbe en unas de 3 o 6 semanas. La cantidad de producto que hace de empleado y el tipo de tejido en el que se aplica.

Indicaciones

Cutanplast® se puede utilizar seco o empapado en solución fisiológica estéril en operaciones de cirugía, a excepción de los oftalmológicos, simple aplicación o ejerciendo una suave presión como hemostáticos para controlar el sangrado de capilares venosos o arteriales, en aquellos casos en los que no es posible emplear técnicas hemostáticas convencionales (sutura, compresión, ligadura, etc).

Cutaneplast®

Cutanplast® se puede cortar del tamano deseado con tijeras estériles sin que se desmenude, además su adhesividad respecto a pinzas e instrumentos quirúrgicos es baja.

Para utilizar Cutanplast®

Póvera es necesario amalgamarlo con solución fisiológica estéril.

Contraindicaciones

No utilizar Cutanplast® para evitar incisiones cutáneas ya que podría interferir con el proceso de curación.

Uso de Cutanplast®

No utilizar Cutanplast® en cavidades intravasculares a causa del riesgo de embolización.

No utilizar Cutanplast®

No utilizar Cutanplast® en procedimientos de embolización.

No utilizar Cutanplast®

No utilizar Cutanplast® en pacientes con alergia comprobada al producto.

No utilizar Cutanplast®

No utilizar Cutanplast® en infectados wound.

Advertencias

- El empleo de Cutanplast® no autoriza la suspensión de las técnicas de hemostasis normalmente utilizadas.

Cuidado

- Con Cutanplast® se alcanza la hemostasis, retirar, si fuera posible, el producto del sitio en el que ha sido aplicado para evitar el riesgo de que se mueva y provocar la compresión de estructuras adyacentes.

Retirada

- Retirar Cutanplast® del lugar en el que ha sido aplicado cuando la aplicación tiene lugar en frámeses óseos, médula espinal y/o en el nervio o quínamo óptico o en zonas circundantes o adyacentes a los mismos.

Retirada

- Retirar Cutanplast® del lugar de aplicación cuando se emplea en neurocirugía o en regiones cercanas a órganos sensibles al dolor como el tejido nervioso, incluyendo pulpos.

Retirada

- No utilizar Cutanplast® en caso de hemorragia arterial severa, en caso de estancamiento de sangre u otros líquidos orgánicos en donde la fuente de la hemorragia esté completamente oculta.

Retirada

- No utilizar Cutanplast® en operaciones postquirúrgicas ni para controlar menorragias.

Seguridad

- La seguridad y eficacia de Cutanplast® en operaciones oftálmicas no ha sido comprobada.

Seguridad

- La seguridad y eficacia de Cutanplast® en mujeres embarazadas y en niños no ha sido comprobada.

Precauciones

Beware: Cutanplast® es supplies sterile and disposable. Unutilized fractions of the product should be discarded. Any opened and unutilized packaging should be discarded.

Precaución

Warning: When in use or closed or narrow tissue spaces preliminary compression of the product is advisable to prevent its increase volume-use, due to contact with organic fluids, causing damage.

Precaución

Warning: When indicated to fill a cavity to obtain haemostasis, Cutanplast® shall not be used this way unless all surplus product is removed after achieving haemostasis.

Precaución

Warning: Use Cutanplast® in minimal amounts to reach haemostasis and always remove any surplus product.

Precaución

The safety and efficiency of Cutanplast® in ophthalmic interventions is not verified.

Precaución

The safety and efficiency of Cutanplast® on children and expectant women is not verified.

Precaución

Beware: Cutanplast® is supplied sterile and disposable. Unutilized fractions of the product should be discarded.

Precaución

Warning: When in use or closed or narrow tissue spaces preliminary compression of the product is advisable to prevent its increase volume-use, due to contact with organic fluids, causing damage.

Precaución

Warning: When indicated to fill a cavity to obtain haemostasis, Cutanplast® shall not be used this way unless all surplus product is removed after achieving haemostasis.

Precaución

Warning: Use Cutanplast® in minimal amounts to reach haemostasis and always remove any surplus product.

Precaución

The safety and efficiency of Cutanplast® in ophthalmic interventions is not verified.

Precaución

The safety and efficiency of Cutanplast® on children and expectant women is not verified.

Precaución

Beware: Cutanplast® is supplied sterile and disposable. Unutilized fractions of the product should be discarded.

Precaución

Warning: When in use or closed or narrow tissue spaces preliminary compression of the product is advisable to prevent its increase volume-use, due to contact with organic fluids, causing damage.

Precaución

Warning: When indicated to fill a cavity to obtain haemostasis, Cutanplast® shall not be used this way unless all surplus product is removed after achieving haemostasis.

Precaución

Warning: Use Cutanplast® in minimal amounts to reach haemostasis and always remove any surplus product.

Precaución

The safety and efficiency of Cutanplast® in ophthalmic interventions is not verified.

Precaución

The safety and efficiency of Cutanplast® on children and expectant women is not verified.

Precaución

Beware: Cutanplast® is supplied sterile and disposable. Unutilized fractions of the product should be discarded.

Precaución

Warning: When in use or closed or narrow tissue spaces preliminary compression of the product is advisable to prevent its increase volume-use, due to contact with organic fluids, causing damage.

Precaución

Warning: When indicated to fill a cavity to obtain haemostasis, Cutanplast® shall not be used this way unless all surplus product is removed after achieving haemostasis.

Precaución

Warning: Use Cutanplast® in minimal amounts to reach haemostasis and always remove any surplus product.

Precaución

The safety and efficiency of Cutanplast® in ophthalmic interventions is not verified.

Precaución

The safety and efficiency of Cutanplast® on children and expectant women is not verified.

Precaución

Beware: Cutanplast® is supplied sterile and disposable. Unutilized fractions of the product should be discarded.

Precaución

Warning: When in use or closed or narrow tissue spaces preliminary compression of the product is advisable to prevent its increase volume-use, due to contact with organic fluids, causing damage.

Precaución

Warning: When indicated to fill a cavity to obtain haemostasis, Cutanplast® shall not be used this way unless all surplus product is removed after achieving haemostasis.

Precaución

Warning: Use Cutanplast® in minimal amounts to reach haemostasis and always remove any surplus product.

Precaución

The safety and efficiency of Cutanplast® in ophthalmic interventions is not verified.

Precaución

The safety and efficiency of Cutanplast® on children and expectant women is not verified.

Precaución

Beware: Cutanplast® is supplied sterile and disposable. Unutilized fractions of the product should be discarded.

Precaución

Warning: When in use or closed or narrow tissue spaces preliminary compression of the product is advisable to prevent its increase volume-use, due to contact with organic fluids, causing damage.

Precaución

Warning: When indicated to fill a cavity to obtain haemostasis, Cutanplast® shall not be used this way unless all surplus product is removed after achieving haemostasis.

Precaución

Warning: Use Cutanplast® in minimal amounts to reach haemostasis and always remove any surplus product.

Precaución

The safety and efficiency of Cutanplast® in ophthalmic interventions is not verified.

Precaución

The safety and efficiency of Cutanplast® on children and expectant women is not verified.

Precaución

Beware: Cutanplast® is supplied sterile and disposable. Unutilized fractions of the product should be discarded.

Precaución

Warning: When in use or closed or narrow tissue spaces preliminary compression of the product is advisable to prevent its increase volume-use, due to contact with organic fluids, causing damage.

Precaución

Warning: When indicated to fill a cavity to obtain haemostasis, Cutanplast® shall not be used this way unless all surplus product is removed after achieving haemostasis.

Precaución

Warning: Use Cutanplast® in minimal amounts to reach haemostasis and always remove any surplus product.

Precaución

The safety and efficiency of Cutanplast® in ophthalmic interventions is not verified.

Precaución

The safety and efficiency of Cutanplast® on children and expectant women is not verified.

Precaución

Beware: Cutanplast® is supplied sterile and disposable. Unutilized fractions of the product should be discarded.

Precaución

Warning: When in use or closed or narrow tissue spaces preliminary compression of the product is advisable to prevent its increase volume-use, due to contact with organic fluids, causing damage.

Precaución

Warning: When indicated to fill a cavity to obtain haemostasis, Cutanplast® shall not be used this way unless all surplus product is removed after achieving haemostasis.

Precaución

Warning: Use Cutanplast® in minimal amounts to reach haemostasis and always remove any surplus product.

Precaución

The safety and efficiency of Cutanplast® in ophthalmic interventions is not verified.

Precaución

The safety and efficiency of Cutanplast® on children and expectant women is not verified.

Precaución

Beware: Cutanplast® is supplied sterile and disposable. Unutilized fractions of the product should be discarded.

Precaución

Warning: When in use or closed or narrow tissue spaces preliminary compression of the product is advisable to prevent its increase volume-use, due to contact with organic fluids, causing damage.

Precaución

Warning: When indicated to fill a cavity to obtain haemostasis, Cutanplast® shall not be used this way unless all surplus product is removed after achieving haemostasis.

Precaución

Warning: Use Cutanplast® in minimal amounts to reach haemostasis and always remove any surplus product.

Precaución

CUTANPLAST®



Opis produktu
Cutanplast® to sterylna gąbka z żelaznym pochodzeniem zwierzęcym, nierożpuszczalna w wodzie, łatwa w manipulacji i resorbowana. Ułatwia zatrzymywanie krwawienia.

Gąbka charakteryzuje się bliskim kolorem i jednorodną porowatością.

Mechanizm działania
Po naciśnięciu krwiąka produkt sprząga koagulację pomagając w kontroli lokalnego krewotoku. Przy stosowaniu prawidłowo w odsiedlejowej ilości, gąbka Cutanplast® jest wchłaniała w ciągu 3-4 tygodni. Ilość produktu, jakiej należy użyć, oraz jego wchłanianie zależą od tego, jak rozległa jest krwawiąca powierzchnia i od rodzaju tkanki, na którą jest nakładany.

Wskazania
Cutanplast® może być stosowany przy żylakach i naczyniach żyłkowych, nierożpuszczalnych w wodzie, łatwych do manipulacji i resorbowanych. Ułatwia zatrzymywanie krwawienia.

Nie stosować Cutanplast® w jamach wewnętrznozacyjnych ze względu na ryzyko spowodowania zatorów.

Nie stosować Cutanplast® w procedurach embolizacyjnych.

Nie stosować Cutanplast® u pacjentów z potwierdzoną alergią na produkt.

Nie stosować Cutanplast® na zainfekowane w rany.

Ostrzeżenia
- Zastrzeganie Cutanplast® nie upoważnia do pominiecia zwykłych przypadek hemostazy.

- Po zatrzymaniu krwawienia, należy wykonać jedyńcą możliwą, produkty z rany, aby uniknąć ryzyka przesunięcia się gąbki i możliwego udziału przylegających tkanej.

- Używać Cutanplast® po użyciu, gdy został zastosowany w otworach kostnych, w rdzeniu kostnym lub w niewielkim zakresie, aby zapobiec zatrzymaniu krwi lub z sąsiadującymi lub przylegającymi do nich regionami.

- Usuwać Cutanplast® z miejsca zastosowania, jeśli został użyty w nerwach kręgowych lub też w w obrębie lub w okolicy nerwu, gdyż zwiększa swój objętość może on spowodować ucisk, a w konsekwencji uszkodzenie, również poważne, tkanki nerwowej.

- Nie stosować Cutanplast® w miejscach, gdzie tkanka nerwowa jest zraniona, zatrzymana, zatrzymano ją i po której zatrzymaniu zostało zatrzymane krwotok w kierunku krwi lub innych płynów ustrojowych lub po śledziu krewotoku jest całkowicie skryte.

- Nie stosować Cutanplast® w zabiegach poprawkowych oraz do kontroli krewotoku mięśniackiego.

- Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania Cutanplast® w chirurgii oka nie została sprawdzona.

- Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania Cutanplast® u dzieci i kobiet w ciąży nie została sprawdzona.

- Czuciówka pod skórą nie została sprawdzona.

Średni ostrzegawczy
Uwaga: Cutanplast® jest dostarczany sterinely i do użytku jednorazowego. Niewykorzystane części gąbki należy wycofać. Opakowanie otwarte i niewykorzystane muszą zostać usunięte.

Uwaga: Gdy produkt jest stosowany w zamkniętych lub wąskich przestrzeniach tkankowych, zaleca się jego wyciągnięcie z gąbki i zatrzymanie krwawienia za pomocą innego sposobu.

Uwaga: Chociaż w niektórych przypadkach zalecane jest wycięcie jamy w celu zahamowania krewotoku, nie należy stosować w ten sposób Cutanplast®, jeśli nie usunie się przy tym dokładnie, po osiągnięciu hemostazy, nadmierną produkcję.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Nie stosować Cutanplast® w połączeniu z cementem z metakrylanu i lejusem. Wykazano, że częstotliwość hemostazy mogą przedstać się przez fizjologiczną reakcję opóźnioną.

Uwaga: Stwardzono przypadkowe wycieczki krwotoczne w tle kontroli krewotoku mięśniackiego.

Uwaga: Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania Cutanplast® w chirurgii oka nie została sprawdzona.

Uwaga: Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania Cutanplast® w chirurgii oka nie została sprawdzona.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Nie stosować Cutanplast® w połączeniu z cementem z metakrylanu i lejusem. Wykazano, że częstotliwość hemostazy mogą przedstać się przez fizjologiczną reakcję opóźnioną.

Uwaga: W przypadku zatrzymania krwawienia, należy usunąć przy tym dokładnie, po osiągnięciu hemostazy, nadmierną produkcję.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.

Uwaga: Należy stosować gąbkę i lejus Cutanplast® gwarantującą hemostazę i unijącą zawsze nadmierną produkcję krwotoku.